

Doplnění poučení a dotazník pro vyšetření srdce magnetickou rezonancí

(tento dokument navazuje na obecné Poučení a dotazník před vyšetřením magnetickou rezonancí a je nedílnou součástí tohoto dokumentu)

Jméno a příjmení vyšetřovaného:

Rodné číslo:

Vážená paní, vážený pane,

vyšetření srdce obvykle trvá 45-60 minut a během vyšetření budete vyzváni, abyste se nehýbali a budete opakovaně požádáni o zadržení dechu na kratší dobu. Během vyšetření Vám bude monitorováno EKG, v případě zátěžového vyšetření i krevní tlak.

Ve většině případů vyžaduje vyšetření aplikaci kontrastní látky do žíly. V případě zátěžového srdce Vám bude do žíly aplikován adenosin, regadenoson či dobutamin. Tyto látky způsobují rozšíření zdravých koronárních (srdečních) tepen a po následném podání kontrastní látky jste schopni zhodnotit rozdíly v prokrvení srdeční svaloviny a ověřit tak významnost případného zúžení koronární tepny. Po podání těchto látek můžete pociťovat **dušnost, tlak na hrudi, bolest či motání hlavy**. U pacientů s epilepsií je riziko vyvolání epileptického záchvatu.

Při vyšetření obdržíte do ruky balónek a v případě, že by se zmíněné vedlejší účinky stupňovaly, bude po zmáčknutí balónek povolán zdravotnický personál.

24 hodin před vyšetřením je nutné vynechat nápoje s obsahem kofeinu (káva, čaj, Coca-Cola), čokoládu a léky s obsahem aminofylinu (např. Syntophylin). Zátěžové vyšetření srdce se provádí na lačno, 4 hodiny (ranní léky lze užít a zapít malým množstvím tekutin).

Pro dobrý kontakt elektrod EKG s kůží prosíme muže o oholení levé poloviny hrudníku.

Podpisem pod tento dokument prohlašujete:

- že jste byl(a) informován(a) o účelu, povaze, důsledcích, rizicích, možných komplikacích a alternativách vyšetření,
- že jste měl(a) možnost seznámit se s výše uvedeným textem, osobně klást doplňující dotazy a pokud tomu tak bylo, veškeré dotazy byly řádně zodpovězeny a podaným informacím jste plně porozuměl(a),
- že v případě výskytu komplikací souhlasíte, aby byly provedeny všechny další potřebné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.
- že na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení svobodně a bez nátlaku souhlasíte s tímto vyšetřením.

Kofein vyloučen ze stravy 24 h (káva, čaj, kakao, čokoláda) ano ne

Vysazeny léky (syntofylin, dipyridamol, sildenafil) ano ne

Astma / CHOPN ano ne

Epilepsie: ano ne

Užívané léky:

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum:

Podpis pacienta:

Zdravotnický pracovník, který provedl poučení a vyplnění:

.....

.....

Zátěžový protokol

adenosin regadenoson dobutamin viabilita dobutamin zátěž

I.v. podáno:

adenosin max. dávka: ug/kg/min

regadenoson dávka: mg

dobutamin max. dávka: ug/kg/min

aminofylin: mg

Monitorace	TF /min.	TK mmHg	SpO2 %	poznámky
před podáním				
čas zahájení zátěže:				
1. min.				
2. min.				
3. min.				
4. min.				
5. min.				
6. min.				
čas ukončení zátěže:				
Po ukončení vyš.				

Symptomy

mírné		dušnost, nauzea, nával, bolesti na hrudi/v krku, bolesti hlavy, ostatní
střední		infuze předčasně ukončena bez nutnosti intervence
závažné		intervence nutná

Jméno lékaře a podpis

Pacient propuštěn v hodin, v celkově dobrém stavu. Sestra: