



Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost pro transfuzní lékařství



V Praze, dne 12.01.2021

COVID-19 a transfuzní služba

– doporučení pro darování krve a jejích složek v souvislosti s očkováním proti SARS-CoV-2

1/ Odklad po očkování

V souvislosti se zahájením vakcinace proti onemocnění covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 výbor STL doporučuje v souladu se stanoviskem České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Evropského centra pro kontrolu infekčních chorob (ECDC):

- po aplikaci **mRNA vakcín** (Pfizer/BioNTech, Moderna) a **proteinových vakcín** (Novavax, Sanofi) **odklad 7 dnů po každé vakcinační dávce**, pokud se nevyskytnou další obtíže,
- po aplikaci **vektorových vakcín** (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) **odklad 28 dní po každé vakcinační dávce** (nelze vyloučit změnu stanoviska po získání více zkušeností s vakcinací).

2/ Vakcinace a darování rekonvalescentní plazmy

- Protože dosud nejsou dostatečné informace o tom, zda a jak se liší imunitní odpověď po vakcinaci s imunitní odpovědí po prodělání infekce, **nejsou t.č. osoby po vakcinaci a bez předem prokázané infekce virem SARS-CoV-2 vhodné jako dárci rekonvalescentní plazmy** (nelze vyloučit změnu stanoviska po získání více zkušeností s vakcinací).
- U osob, které již rekonvalescentní plazmu darují nebo prokazatelně prodělaly infekci virem SARS-CoV-2, resp. onemocnění covid-19 a byla jim aplikovaná vakcína, se odběry rekonvalescentní plazmy provádí s doporučeným odkladem, viz ad 1/.

Výbor Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP